### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Conserver le produit sous clef à l'écart des aliments et boissons et hors de portée des enfants et des animaux.
- Éviter tout contact avec la peau et les veux.
- Porter des vêtements et du matériel de protection
- Ne pas inhaler le produit
- Ne pas manger, fumer ou boire pendant l'application du
- Se laver soigneusement à l'eau et du savon après traitement
- Détruire les emballages vides
- Conserver le produit dans son emballage d'origine

## **PREMIERS SECOURS**

Eloigner la personne atteinte de la zone de travail. Contacter un médecin de toute urgence en cas d'intoxication

## **ANTIDOTE**

Pas d'antidote spécifique. Traitement symptomatique

### **GARANTIE ET RESPONSABILITE**

Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages causés aux cultures, à l'environnement, aux hommes et aux animaux du fait d'une mauvaise utilisation et du nonrespect des recommandations d'usages.

Notre responsabilité est limitée à la fourniture de produits conformément aux spécifications sur l'emballage.

# PHYTOCAO 40 EC

Acetamipride 20 g/l + Bifenthrine 20 g/l Puissant Insecticide contre mirides, punaises et borers du cacaover





Date de fabrication Date de péremption

Distribué par: VOLCAGRO Côte d'Ivoire 01 BP 10398 Abidjan 01, tél. (225) 21 28 60 06, volcagroci@yahoo.fr

No Lot

SHANGHAI FOREVER CHEMICAL Co., Ltd., Room 302 Tomson centre, No 188 Zhangyang Road, Shanghai, PR China

Fabriqué par:

# MODE D'EMPLOI

PHYTOCAO 40 EC est une formulation associant deux insecticides puissants: l'acetamipride de la famille des nicotinoides et la bifenthrine de la famille des pyrethrinoides. Ces deux insecticides agissent de facon complementaire. La bifenthrine, avec son action de choc, foudroie les ravageurs présents au moment du traitement. L'acetamipride, par sa fonction systémique (pénétration dans la plante) prolonge l'efficacité du traitement sur une plus longue période (au moins deux mois) empêchant ainsi une réinfection rapide, PHYTOCAO 40 EC est un insecticide anti-borers du cacaoyer aussi efficace contre les mirides.

## PERIODES DE TRAITEMENT

SEULEMENT 2 APPLICATIONS PAR AN

- 1 Application en: juillet-Aout
- 1 Application en: Décembre-Janvier


### DOSES D'APPLICATION: 0,5 L/HA

Soit une boite de 1 L pour 2 ha de cacaoyers, une boite de 125 ml pour 1/4 ha de cacaoyers.

### VOLUME DE BOUILLIE

Traitement à l'atomiseur: 40 litres de bouillie par hectare.

**DELAI AVANT RECOLTE: 15 iours** 













2Ha























